

**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ GÃY LIÊN MÁU
CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI BẰNG NẸP VÍT DHS SỬ DỤNG KỸ THUẬT ÍT
XÂM LẤN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH**

BSCKII Nguyễn Tấn Vương, BSCKII Trương Kim Hùng, BSCKII Huỳnh Phùng
TÓM TẮT NGHIÊN CỨU

Gãy liên máu chuyển xương đùi là loại nằm ngoài bao khớp, có thể gặp ở nhiều lứa tuổi nhưng ở người già có tỉ lệ cao hơn, phần lớn bệnh nhân là phụ nữ. Gãy xương vùng háng chiếm tỷ lệ thấp (14%) nhưng lại chiếm tỷ lệ rất cao về tàn tật và tử vong (27%). **Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu:** Gồm 26 người bệnh gãy kín LMC xương đùi được phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp DHS và sử dụng kỹ thuật ít xâm lấn tại khoa ngoại Chân Thương – Bông Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bình Định từ tháng 20/5/2020 đến tháng 30/5/2021. **Mục tiêu:** 1) *Mô tả đặc điểm lâm sàng và Xquang trong gãy liên máu chuyển ở người bệnh có chất lượng xương độ: IV, V, VI theo Singh.* 2) *Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị gãy liên máu chuyển xương đùi bằng nẹp vít DHS sử dụng kỹ thuật ít xâm lấn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.* **Phương pháp nghiên cứu:** tiến cứu mô tả theo dõi dọc. **Kết quả:** Tuổi trung bình là $70,0 \pm 12,1$ tuổi, tỷ lệ nam/nữ là 12/14. Hầu hết các bệnh nhân gãy liên máu chuyển xương đùi là do TNSH và được phẫu thuật trong khoảng thời gian 24 – 72 giờ sau nhập viện. Tất cả các bệnh nhân gãy liên máu chuyển xương đùi đều có biểu hiện: đau vùng háng, mất cơ năng và xoay ngoài bàn chân. 50% các trường hợp có ghi nhận bệnh lý nội khoa kèm theo. Trong đó tăng huyết áp và đái tháo đường là hay gặp nhất. Thời gian phẫu thuật trung bình ngắn $44,8 \pm 7,4$ phút. Tỷ lệ truyền máu 19,2%. Kích thước trung bình của vết mổ là $4,7 \pm 1,3$ cm. Thời gian nhập viện điều trị trung bình là $8,5 \pm 2,2$ ngày và thời gian hậu phẫu trung bình là $5,9 \pm 1,7$ ngày. Giảm đau sau mổ rõ giúp bệnh nhân vận động sớm. Liên vết mổ kỳ đầu 100%. Liên xương 94,4%. 1 bệnh nhân nữ 82 tuổi xương không liền do loãng xương. Không có trường hợp nào góc cổ thân < 110°. Kết quả chung theo thang điểm HHS: Rất tốt 77,7%, tốt 11,1%, trung bình 5,6%, kém 5,6%. **Kết luận:** phẫu thuật ít xâm lấn điều trị gãy kín liên máu chuyển xương đùi đem lại kết quả khả quan và nhiều lợi ích cho người bệnh. **Kiến nghị:** bệnh nhân gãy liên máu chuyển xương đùi nên được theo dõi cẩn thận và phẫu thuật sớm tránh loét tỉ đè. Nên thực hiện phẫu thuật kết hợp xương ít xâm lấn để đem lại nhiều lợi ích hơn cho người bệnh./.

