

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRÀNG PHẢI BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI

*Nguyễn Quốc Kha, Dương Đỗ Hồng Nhân
BVĐK Tỉnh Bình Định*

TÓM TẮT NGHIÊN CỨU

Đặt vấn đề: Ung thư đại tràng là một bệnh lý ác tính thường gặp, đứng hàng đầu trong ung thư đường tiêu hóa tại các quốc gia Âu và Mỹ. Tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bình Định, phẫu thuật nội soi được áp dụng trong điều trị ung thư đại tràng đã nhiều năm, tuy nhiên chưa được nghiên cứu có hệ thống. **Mục tiêu:** (1) Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư đại tràng phải được điều trị bằng phẫu thuật nội soi. (2) Đánh giá kết quả sớm điều trị ung thư đại tràng phải bằng phẫu thuật nội soi. **Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:** Nghiên cứu tiền cứu mô tả trên 86 bệnh nhân tại khoa Ngoại Tổng Hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Thời gian nghiên cứu: từ tháng 09/2020 đến 10/2021. **Kết quả:** Tuổi mắc bệnh trung bình là $54,5 \pm 12,9$. Triệu chứng cơ năng thường gặp nhất là đau bụng (87,2%). Triệu chứng thực thể u ổ bụng gặp 13,9%. Carcinoma Embryo Antigen trước mổ cao gặp 33,7%. Nội soi đại tràng tỷ lệ phát hiện u 100%, chụp cắt lớp vi tính ổ bụng phát hiện u 97,7%. Giai đoạn bệnh thường gặp là giai đoạn II (44,2%). Thời gian mổ ngắn, trung bình là $135,5 \pm 34,1$ phút. Tỷ lệ di căn hạch chung là 38,8%. Diện cắt đầu gần cách u 24,2cm; diện cắt đầu xa cách u 13,9cm. Tỷ lệ tai biến và biến chứng sau mổ thấp (1,2%; 5,9%). Không có bệnh nhân nào tử vong trong và sau mổ. Tỷ lệ chuyển mổ mở thấp 1,2%. Hồi phục nhanh sau mổ, đa số bệnh nhân có nhu động ruột trong vòng 2 ngày. Thời gian nằm viện trung bình sau mổ $8,1 \pm 2,0$ ngày. **Kết luận:** Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại tràng phải có nhiều lợi điểm, an toàn, hiệu quả. **Kiến nghị:** Cần có chiến lược quốc gia tầm soát phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa nhằm đem lại hiệu quả điều trị tối đa cho bệnh nhân./.